

※お手数ですが患者さんへ必ずお渡しください。

MRI・CT・シンチグラム検査を行うにあたって

食事制限と水分摂取および注意事項について

MRI 検査	造影なし	この検査の食事制限はありません。
	造影 <u>あり</u>	<ul style="list-style-type: none">◆ 食事は検査時間の3時間前までに済ませてください。◆ 水分は『ミネラルウォーター・水道水』を直前まで摂取できます。喉が渇いた状態で検査を受けられることはお避けください。ただし、内容成分のあるジュース・牛乳などは飲まないでください。
	MRCP	<ul style="list-style-type: none">◆ 食事は検査時間の4時間前までに済ませてください。◆ 水分は『ミネラルウォーター・水道水』を1時間前まで摂取できます。ただし、上記以外の水分は取らないようにしてください。
	MRI 検査 注意事項	<ul style="list-style-type: none">◆ ネイルアート（マグネットネイルや磁性体を使用したジェルネイル）をされている方は原則 MRI 検査を行うことができません。事前に除去したうえでご来院ください。◆ 当日の金属成分を含む化粧品や髪染めスプレーの使用は控えてください。◆ コンタクトレンズを使用したまま検査を行えません。ケースをご持参ください。◆ 保温性下着（ヒートテック等）で低温火傷をする場合がありますので着用は控えてください。◆ ペースメーカー装着者は、原則 MRI 検査ができません。
CT 検査	造影なし	この検査の食事制限はありません。
	造影 <u>あり</u>	<ul style="list-style-type: none">◆ 食事は検査時間の3時間前までに済ませてください。◆ 水分は『ミネラルウォーター・水道水』を直前まで摂取できます。喉が渇いた状態で検査を受けられることはお避けください。ただし、内容成分のあるジュース・牛乳などは飲まないでください。◆ 糖尿病のお薬を内服している方へ<ul style="list-style-type: none">● お薬の種類によっては事前に内服を中止する必要がありますので、予め糖尿病の主治医にご相談ください。● イニシンク配合、エクメット配合、グリコラン、メタクト配合、メトグルコ、メトホルミン、ジベトス、ジベトン S 腸溶錠、メトアナ配合錠 HD を内服中の方は検査前、後 2 日間は内服を中止してください。造影剤が使用できない場合があります。● 検査当日は、内服している糖尿病のお薬の名前を CT 検査担当者にお知らせください。
シンチグラム	脳血流/ガリウム全身/骨全身/レノグラム/肺血流	この検査の食事制限はありません。

※当日は、予約時間の20分前までに 1 階①紹介状受付までお越しください。

手続き後、放射線科受付 1A（1階）へのご案内となります。