

# 緊急時の対応

## 全脊髄くも膜下麻酔の疑い

足が全く動かない  
呼吸苦  
血圧低下  
徐脈  
意識レベル低下

## 局所麻酔中毒の疑い

口唇の痺れ  
味覚異常  
興奮・多弁  
視覚・聴覚障害  
↓  
痙攣・意識障害  
不整脈・呼吸/心肺停止

PCAポンプの停止

救急カート  
麻酔カート  
全麻トレイ  
無痛用薬剤  
(イントラリポス、  
ブリディオオン)

脂肪乳剤 (イントラリポス)  
投与 (別紙参照)

分娩室管理医師  
**566259**  
分娩室リーダー  
**560561**

麻酔科管理医師  
**566888**  
救命救急科医師  
**566065**

## 症状の確認及び対応

血圧低下

徐脈

呼吸停止

痙攣

ボルベン全開  
下肢挙上  
エフェドリン

エフェドリン  
アトロピン 1A

マスク換気  
吸引準備  
気管挿管準備

ジアゼパム1/2A  
無効なら2分あけてさらに1/2A

医師の判断で他の薬剤使用可

帝王切開の判断

# 局所麻酔中毒における 脂肪乳剤投与プロトコール

20%イントラリポス100mlを1分  
かけて急速投与→100mlを5分で  
投与し評価

回復

回復せず

10分程度持続投与

回復

100mlを1分で急  
速投与→200mlを  
5分で投与し評価

回復

回復せず

100mlを1分で急速投与

心肺蘇生  
死戦期帝王切開  
ECMO

心肺停止